


## 1 QUITAR EL VENDAJE


Quítese el vendaje después de **24-48 horas**. Manténgalo seco hasta su remoción.

Si tiene steri-strips (el vendaje delgado que se adhiere directamente a la herida), no tiene que hacer nada hasta que se caigan por sí solos. Esto suele ocurrir en 1-2 semanas. Puede mojarlos.




## 2 LAVAR

Lávese la herida una vez al día con **agua y jabón**. Si se lava la herida durante su baño, asegúrese de que sea lo último que haga antes de salir de la ducha.



## 3 UNGÜENTO

Aplique una cantidad abundante de **Vaselina** a la herida. Por favor, **no use Neosporin**.



## 4 VENDAJE DE NUEVO

Vuelva a vendar con una **curita**. Si es sensible al adhesivo, use **cinta de papel**.

## 5 REPETIR

Cambie su vendaje **diariamente** y repita hasta que la herida esté completamente curada. Si tiene suturas, continúe con estos pasos incluso después de retirar las suturas.

## 6 VOLVER

Volver para **retiro de suturas** en \_\_\_\_\_ días.

Volver para **la cita** en \_\_\_\_\_ días.

## SIGNOS DE INFECCIÓN

Llame a la oficina si tiene algún signo de infección, como líquido maloliente de color amarillo verdoso que drena de la herida, enrojecimiento o hinchazón que se expande alrededor de la herida, dolor o cualquier otro síntoma preocupante.

## SANGRADO

Si tu herida comienza a sangrar después de que te vayas, toma una toalla limpia y mantén presionada la herida durante **30 minutos sin soltarla**. Una vez que se detenga el sangrado, vuelva a vendar como de costumbre. Si no se detiene, llame a la oficina.